


MONITOROVACÍ ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ

č.: 2 Týden: 22 Období: 27. 5. 2019 - 2. 6. 2019



55

PADLÍ RÉVOVÉ ●

Na většině lokalit je již riziko šíření padlí na střední úrovni. Teploty se rychle překulily k hranicím 30 °C a proto riziko padlí nelze podceňovat, zejména nyní – před kvetením. V tomto období je třeba zahájit ošetřování rizikových porostů proti padlí révovému, zejména na lokalitách s pravidelným výskytem choroby a u náchylných odrůd. Na takových lokalitách je zapotřebí přistoupit k ochraně pomocí systémových přípravků, stále v kombinaci se sírou.

PLÍSEŇ RÉVOVÁ ●

Optimální teploty pro plíseň révovou jsou nyní splněny, teploty se pohybují mezi 21 až 30 °C. Na některých vinicích byly v minulých dnech zaznamenány první výskyty primárních infekcí a v tuto chvíli se střední infekční tlak velmi rychle na více místech přehoupl na vysoký. Panují ideální podmínky k šíření choroby, proto je zapotřebí přistoupit k aplikaci systémových fungicidů již nyní!

OBALEČ MRAMOROVANÝ A OBALEČ JEDNOPÁSÝ ●

Všem vinařům doporučujeme bedlivě sledovat průběh letu 1. generace obalečů ve feromonových lapácích. Biopreparáty ošetřujte 3-5 dní po vrcholu letové aktivity, optimálně při teplotě nad 18 °C. Ostatními přípravky ošetřujte 8-10 dnů po vrcholu letu. Velkopěstitelé mohou užít přípravek STEWARD (0,15 kg/ha), pro malopěstitele doporučujeme přípravek RELDAN (0,22%).

SVILUŠKY ●

Nyní nastává pravý čas na ochranu révy vinné proti sviluškám. Na místech, kde se vyskytují opakovaně každým rokem, doporučujeme přípravek NISSORUN (0,8 kg/ha). Tento postřik je v letošním roce k dostání jak pro velkopěstitele tak také pro hobby pěstitele révy vinné.


Riziko rozvoje: ● slabé ● střední ● silné

DETAILNÍ PŘEHLED O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ

obec	Infekční tlak		Doporučené přípravky dle infekčního tlaku		
	padlí révové	plíseň révová	padlí révové	plíseň révová	obaleči
Blatnice			-	-	-
Bořetice			Dynali	Pegaso F	Integro
Bzenec			Kumulus	Cuproxtat	Spintor
Čejkovice					
Lednice					
Lužice					
Němčičky					
Nosislav					
Pavlov					
Popice					
Přítluky					
Ratíškovice					
Strážnice					
Těšany					
Valtice					
Velké Bílovice					
Velké Pavlovice					
Znojmo					
Modra (SK)					
Šenkvice (SK)					
Svatý Jur (SK)					
Legenda	slabý	střední	silný		



Výhled počasí



Další důležité informace:

Na mnoha lokalitách se projevilo **zhoršené a nestejně rašení oček** a celkově slabší počáteční růst letorostů. Tento stav může souviset se sníženou vitalitou oček v důsledku nedostatku vláhy v průběhu loňského roku a na počátku vegetace letošního roku, se střídáním teplot, případně s nadměrnou úrodou v loňském roce.

Na více lokalitách byly zaznamenány významné výskyty škůdce **vlnovníka révového**. Při silnějším napadení byla dokonce poškozena i květenství. Proto vždy pamatujte na preventivní jarní postřiky sírou!

Dovolujeme si zákazníky upozornit, že do fáze kvetení je nutné vždy používat nižší dávku přípravku uvedenou na etiketě či v příbalovém letáku!

Nastává vhodná doba pro první aplikace listové výživy, zejména **živin** potřebných **pro správný a zdravý odkvět révy** vinné (B, Zn, Mo). Vyzkoušejte naše „chytré“ hnojivo pro révu vinnou – VÍNOFIT.

