

# MONITOROVACÍ ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ

č.: 9

Týden: 29

Období: 15. 7. 2019 - 21. 7. 2019



## PADLÍ RÉVOVÉ ●

Infekční tlak na všech lokalitách velmi pomalu klesá, keře začínají získávat tzv. ontogenetickou rezistenci vůči padlí révovému. Počasí v posledních dnech navíc další větší rozvoj choroby nepodporí. Stále je však potřeba aplikovat ještě minimálně 1 postřik proti padlí révovému a to se systémovou účinnou složkou. Na základě současného vývoje podmínek na vinicích by měla také síra zůstat součástí postřiků a to nejlépe do konce července. Mezi více ohrožené pak patří odrůdy, které mají pozdní kvetení. Ty jsou totiž stále ve fázi vysoké citlivosti k napadení padlím révovým.

## PLÍSEŇ RÉVOVÁ ●

Choroba je na všech lokalitách přibližně stejná jako v minulém období, zůstává na střední až vysoké úrovni infekčnosti. Lze případně hovořit o velmi mírném poklesu. Avšak na vinicích opět zapršelo a došlo také k většímu ochlazení. Vinaři by proto měli být ostražití a nepřestávat se věnovat silnější ochraně vinic před plísní révovou. Podmínky pro šíření jsou nyní optimální. Tam, kde byly zjištěny jasné výskyty choroby, je vhodné intenzivní ošetřování kombinovanými a hloubkově účinkujícími přípravky s delší dobou účinnosti.

## PLÍSEŇ ŠEDÁ ●


Na více lokalitách byly zjištěny příznaky napadení šedou hnilobou (*Botrytis cinerea*) a to jak na květenstvích, tak na listech révy vinné. V případě silnějšího napadení doporučujeme aplikovat nejlepší přípravek na trhu – Switch (obsahuje kontaktní i systémovou účinnou látku). Velmi dobrými přípravky jsou obecně kombinované s určením na plíseň révovou a zároveň s významným vedlejším účinkem proti plísni šedé. V případě silného napadení použijte MELODY COMBI. Náchylné jsou zejména odrůdy s hustým hrozdem. V tomto období začíná být ochrana proti plísni šedé velmi aktuální a to hlavně s ohledem na současný vývoj počasí.

# DETAILNÍ PŘEHLED O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ

obec	Infekční tlak		Doporučené přípravky dle infekčního tlaku	
	padlí révové	plíseň révová	padlí révové	plíseň révová
Blatnice	slabý	střední	-	Ridomil Gold Combi
Bořetice	slabý	střední	Vivando	Ridomil Gold MZ
Bzenec	slabý	silný	Alcedo	Cuproxat
Čejkovice	slabý	střední		
Lednice	slabý	střední		
Lužice	slabý	slabý		
Mikulov	slabý	silný		
Němčičky	slabý	silný		
Nosislav	slabý	slabý		
Pavlov	slabý	střední		
Popice	slabý	silný		
Přítluky	slabý	střední		
Ratíškovice	slabý	silný		
Strážnice	slabý	slabý		
Těšany	slabý	střední		
Valtice	slabý	slabý		
Velké Bílovice	slabý	silný		
Velké Pavlovice	slabý	slabý		
Znojmo	slabý	střední		
Modra (SK)	slabý	střední		
Nitra (SK)	slabý	silný		
Svatý Jur (SK)	slabý	silný		
Legenda	slabý	střední	silný	



## Výhled počasí



## Další důležité informace:

Upozorňujeme zákazníky, že povolení k použití výrobků na bázi THIRAMu (THIRAM GRANUFLO) byla v letošním roce ukončena. Zásoby přípravků určených pro ošetření dřevin proti okusu zvěří nebo hlodavci (Aversol, Stopkus a Pellacol) je umožněno uvádět na trh nejdéle do 30. 7. 2019 a nakoupené zásoby používat nejdéle do 30. 1. 2020.

Na některých lokalitách lze pozorovat symptomy nedostatku hořčíku. Tzv. mezižilková chloróza listů, tj. zesvětlení (bílé odrůdy) nebo zčervenání (modré odrůdy) pletiv mezi hlavními žilkami, přičemž žilky a jejich okolí zůstávají zelené se v letošním roce objevila na více místech. Příznaky lze nejdříve pozorovat na spodních listech, později i ve vyšších listových patrech. Při významnější výskytu doporučujeme odebrat nejdříve vzorek listů ke zjištění aktuálního výživového stavu rostlin a v podzimním období tuto analýzu doplnit i o půdní rozbor. Budete tak nejlépe informovaní o reálném stavu vaší vinice z pohledu výživy, která je základem všeho. Hnojivo s vyšším podílem hořčíku je ideálně WUXAL KOMBI – k dostání v našich prodejnách.



 **VINAŘSKÉ POTŘEBY**