

MONITOROVACÍ ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ

č.: 10

Týden: 28

Období: 7. 7. – 13. 7. 2020



PADLÍ RÉVOVÉ ●

Padlí révy se nyní viditelněji objevuje především na listech. Na některých vinicích jsou ale touto chorobou výrazněji napadeny i vyvíjející se hrozny. Bobule ranějších odrůd by už měly získávat díky ontogenetické rezistenci postupně odolnost a choroba by u nich neměla razantněji postupovat. Středně rané a pozdní odrůdy je však nadále v boji s chorobou co nejlépe podporovat účinnými prostředky. Zejména by měly preventivní postřiky dopadat na keře odrůd citlivých k padlí jako jsou Frankovka, Chardonnay nebo Neuburské. V současné době panuje na všech lokalitách obecně střední infekční tlak padlí révového. Na místech se silným napadením keřů doporučujeme aplikovat Karathane New. K výraznějšímu snížení tlaku padlí došlo v minulém období v Pavlově. Na ostatních hodnocených místech je ale situace prakticky neměnná a s výhledem na počasí dalšího týdne by se toto nemělo měnit. Nadále doporučujeme přidávat do každé postřikové jichy sirnatou ochranu ve formě práškového Kumulusu nebo suspenzního Sulfomaxu.

PLÍSEŇ RÉVOVÁ ●

V minulém období se srážky objevily spíše sporadicky, bylo převážně slunečno. Přesto tyto podmínky na vinicích nijak významně nepotlačily vysoký infekční tlak plísně révové a nadále pro tuto chorobu panují velmi příznivé až ideální podmínky. Příznaky napadení lze najít na listech i na vyvíjejících se hroznech. Teploty nyní oscilují kolem průměrných 20-25 °C. Na všech místech panuje obecně vysoký infekční tlak plísně révové. Vzhledem k intenzivní síle houbových chorob doporučujeme kombinovat systemické a kontaktní účinné fungicidy. Přehled kumulativních úhrnů srážek pro signalizaci plísně révové nadále jasně ukazuje, že je na našich vinicích z pohledu rizika plísně stav stále hodnocen jako kalamitní. Pokud se v příštím týdnu objeví častěji noční přeháňky, nelze vyloučit zhoršení situace. V letošním roce doporučujeme zintenzivnit ochranu proti plísni révové a pokud možno i zkrátit intervaly mezi jednotlivými aplikacemi (vždy dle doporučení v etiketách jednotlivých přípravků a s ohledem na aktuální situaci na konkrétní vinici).

Riziko rozvoje: ● slabé

● střední

● silné

INTENZITA INFEKČNÍHO TLAKU DLE VYBRANÝCH LOKALIT

obec	Infekční tlak	
	padlí révové	plíseň révová
Blatnice	střední	silný
Bořetice	silný	silný
Bzenec	střední	střední
Čejkovice	střední	silný
Kobylí	silný	střední
Lednice	střední	střední
Mikulčice	střední	silný
Mikulov	střední	silný
Nosislav	střední	silný
Pavlov	střední	silný
Popice	střední	silný
Přítluky	silný	silný
Sedlec	silný	silný
Strážnice	střední	silný
Velké Bílovice	silný	silný
Velké Pavlovice	silný	střední
Znojmo	střední	silný
Modra (SK)	střední	střední
Svatý Jur	střední	silný
Šenkvice (SK)	střední	silný
Nitra (SK)	silný	silný

silný	střední	slabý
-------	---------	-------

DOPORUČENÉ PŘÍPRAVKY

padlí révové

plíseň révová

PROFI

HOBBY

PROFI

HOBBY

DYNALI **TOPAS**

FOLPAN GOLD **ACROBAT**

COLLIS **SERCADIS**


PEGASO **PERGADO**

SULFOMAX **SULFOMAX**

AIRONE **RIDOMIL**

silný **střední** **slabý**

Výhled počasí



Další důležité informace:

Doporučujeme střídat přípravky s odlišným mechanismem působení (obsahující odlišné účinné látky) a **vždy dodržovat doporučené dávky**. Nezapomínejte také k posílení odolnosti rostlin přidávat do každého postřiku síru a vhodnou listovou výživu.

Na některých vinicích je možné vidět napadení plísně révové přímo na hroznech. U rezistentních PIWI odrůd lze na místech se zvýšeným infekčním tlakem plísně zaznamenat i specifické obranné reakce (hnědá nekrotická místa).

Nyní je nejvyšší čas pro provedení osečkování letorostů s cílem minimalizovat příznivé podmínky pro další rozvoj houbových chorob. **V případě silného napadení keřů houbovými chorobami doporučujeme sáhnout po velmi efektivních zhásecích.** Proti plísni révové použijte **CYMBAL**, padlí dokáže efektivně zastavit přípravek **KARATHANE NEW**.

