

MONITOROVACÍ ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ




č.: 1

Týden: 19

Období: 5. 5. - 11. 5. 2020


PADLÍ RÉVOVÉ ●



Setkáváme se se silným nedostatkem srážek, teploty se nedostávají do žádných významných extrémů. Z toho pohledu tudíž v současné době nehrozí významné riziko rozvoje padlí révového. Na jihomoravských vinicích jsou obecně podmínky pro šíření infekce padlí révového minimální. Jako vhodné přípravky pro toto období lze označit ty na bázi kontaktního účinku. Právě nyní jsou ideální, protože při aplikaci na rostliny jimi lze dokonale omýt celou listovou plochu, čímž se keřům dostává dostatečná preventivní ochrana před prvními možnými infekčními tlaky. Mimořádně důležitou roli v ochraně proti padlí révovému vždy zastává síra, tu je ideální přidávat do každého tankmixu v průběhu celé vegetace.

Hlavní doporučené přípravky na následující období: **KUMULUS (3 kg/ha)** nebo **SULFOMAX (3 l/ha)**


PLÍSEŇ RÉVOVÁ ●



V tuto chvíli se nevyskytují ideální podmínky pro šíření peronospory. Neobjevují se požadované srážky a ani teplotní podmínky pro rozvoj primárních infekcí nebyly doposud příliš vhodné. Růst letošních letorostů je však již pár dnů v plném proudu a není proto radno déle zaostávat s aplikací preventivních kontaktních přípravků. Ty velmi dobře omezí případný pozdější nástup infekce a dokáží významně ovlivnit toto riziko. Vhodné mohou nyní být měďnaté fungicidy či jiné kontaktní fungicidní přípravky. V budoucím období se neočekávají vydatnější srážky a ani výraznější vzestup průměrných denních teplot nad 20 °C, takže tlak plísně révové by neměl významněji stoupat.

Hlavní doporučené přípravky na následující období: **FLOWBRIX (1,5 l/ha)** nebo **CHAMPION (0,2 %)**


OBALEČI ●



Motýli přezimující generace se mohou na jaře začínat líhnout již začátkem dubna, což lze díky mírné zimě očekávat i v letošním roce. Již nyní je tedy potřeba sledovat vývoj na vinicích a dle signalizace případně použít vhodné insekticidy (např. KARATE SE ZEON TECHNOLOGIÍ, nebo SPINTOR).

Riziko rozvoje: ● slabé ● střední ● silné

Výhled počasí



Další důležité informace:

V průběhu celé zimy a bohužel i nyní panuje v celé republice silný srážkový deficit. Rostliny trpí. U révy vinné jsou v tomto ohledu ohroženy především mladé výsadby, které je nutné v tomto směru plně podporovat. Existuje-li možnost použití kapkové závlahy, v těchto kritických dnech ji využívejte. Plodným výsadbám lze v tuto chvíli pomoci i vhodnými stimulanty na bázi huminových látek (Algahumi aj.) nebo mořských řas, které lze dle návodu v etiketách přidat ke standardně aplikovaným pesticidům.

