

# MONITOROVACÍ ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ



č.: 11

Týden: 29

Období: 14. 7. – 20. 7. 2020



## PADLÍ RÉVOVÉ ●

Na většině lokalit došlo během minulého období k pozvolnému poklesu tlaku padlí révového. Například v Mikulově nebo Pavlově je nyní tlak už na hranici slabé úrovně. Vzhledem k tomu, že nyní nastává doba, kdy už si bobule získávají vlastní ontogenetickou rezistenci proti padlí, je zejména na doposud velmi dobře ošetřených vinicích možno stříkat již jen sírou. Jakmile dosáhnou bobule velikosti hrachu, končívá jejich vysoká citlivost vůči chorobě. Bobule jsou v této fenofázi větší a tím pádem i odolnější k napadení. U středně raných a hlavně pak pozdních odrůd je doporučována nadále co nejkomplexnější ochrana. V současné době panuje na všech lokalitách obecně střední infekční tlak padlí révového, silný tlak choroby není zaznamenán na žádné z hodnocených lokalit.




## PLÍSEŇ RÉVOVÁ ●

Plíseň révová je stále dle ukazatelů portálu amet.cz na vysoké úrovni infekčnosti. Na vinicích, kde byla zavčasu podchycena preventivní ochrana keřů, se však doposud nemusely objevit žádné specifické příznaky choroby. To nemění nic na situaci, že i nadále je potřeba v této důkladné prevenci vytrvat, stále ještě totiž nemusí být vyhráno. Počasí dalších dnů může situaci na vinicích během pár dnů zhoršit a symptomy napadení touto houbovou chorobou se mohou zviditelnit. Nadále doporučujeme kombinovat přípravky na bázi systemických a kontaktních účinných látek. V letošním roce doporučujeme zintenzivnit ochranu proti plísni révové a pokud možno i zkrátit intervaly mezi jednotlivými aplikacemi (vždy dle doporučení v etiketách jednotlivých přípravků a s ohledem na aktuální situaci na konkrétní vinici). Dále je velmi vhodné omezit nyní listová hnojiva s vysokým podílem dusíku.

Riziko rozvoje: ● slabé ● střední ● silné

## Výhled počasí




## Další důležité informace:

Pro zajištění co nejlepší účinnosti aplikovaných fungicidů a také s ohledem na častější výskyt srážek, je vhodné do tankmixu přidávat vhodné **smáčedlo**. Dojde tak k mnohem lepší efektivitě postřikování, protože bude aplikační kapalina pokryta větší část listové plochy a zároveň uskutečněn rychlejší vstup účinných látek do rostlin.

V době nejvyšší infekčnosti, kdy jsou příznaky silné a velmi dobře viditelné, by měly být vždy aplikovány systémové fungicidy v kombinaci s kontaktními (plíseň révová: měď, folpet, mankozeb; padlí révové: síra).

Před uzavíráním hroznů je **nejvyšší čas začít s prevencí proti plísní šedé** a to zejména u odrůd s hustým hroznem. Ideálním přípravkem je kombinovaný fungicid **SWITCH**.

**V případě silného napadení keřů plísní révovou použijte CYMBAL.** Zároveň dbejte na omezení aplikace foliárních hnojiv s vysokým podílem dusíku (netýká se klasických granulovaných dusíkatých hnojiv do půdy). Dusík podporuje rozvoj houbových chorob a v tuto chvíli proto není na listech keřů ve formě aplikovaných listových hnojiv žádoucí.



# INTENZITA INFEKČNÍHO TLAKU DLE VYBRANÝCH LOKALIT

obec	Infekční tlak	
	padlí révové	plíseň révová
<b>Blatnice</b>	střední	silný
<b>Bořetice</b>	střední	střední
<b>Bzenec</b>	střední	střední
<b>Čejkovice</b>	střední	silný
<b>Kobylí</b>	střední	střední
<b>Lednice</b>	střední	střední
<b>Mikulčice</b>	střední	silný
<b>Mikulov</b>	slabý	silný
<b>Nosislav</b>	střední	silný
<b>Pavlov</b>	slabý	silný
<b>Popice</b>	střední	silný
<b>Přítluky</b>	střední	střední
<b>Sedlec</b>	slabý	silný
<b>Strážnice</b>	střední	silný
<b>Velké Bílovice</b>	střední	silný
<b>Velké Pavlovice</b>	střední	slabý
<b>Znojmo</b>	slabý	silný
<b>Modra (SK)</b>	střední	střední
<b>Svatý Jur</b>	střední	silný
<b>Šenkvice (SK)</b>	střední	silný
<b>Nitra (SK)</b>	střední	silný

silný

střední

slabý

## DOPORUČENÉ PŘÍPRAVKY

padlí révové

plíseň révová

PROFI

HOBBY

PROFI

HOBBY

VIVANDO

DYNALI

RIDOMIL MZ PEPITE

RIDOMIL MZ PEPITE

PROSPER

TOPAS

PEGASO

MILDICUT

KUMULUS

SULFOMAX

CUPROXAT

CHAMPION

silný

střední

slabý